

Diagnostikschema bei V.a. nichtakzidentelles Trauma

_____, geb. am: _____ Alter: ____ m/w Station:
Name, Vorname Ambulant

Röntgen

- Skelettscreening (im Orbis als Schema bei V. a. Kindesmisshandlung)
(alle Extremitäten in 1 Ebene, bzw. bei Frakturverdacht in 2 Ebenen, Thorax 1 Ebene, Wirbelsäule in 2 Ebenen, Schädel 2 Ebenen)
- Sonstige: _____

Zerebrale Bildgebung (Schädel und evtl. WS)

- MRT
- CCT (nur bei lebensbedrohlichem Zustand)

Sonographie

- Abdomen
- Schädel
- Schädel-Doppler

Labor

- BB+Diff, BSG, BGA, CRP, Krea, Na, K, Ca, P
- y-GT, ALAT, ASAT, AP, Amylase, Lipase
- Quick, PTT, Fibrinogen, v. Willebrand-Faktor, Kollagenbindungsaktivität, F VIII, F IX
(bei Jungen), F XIII, Blutgruppe, (Plättchenfunktionstest (PFA 100))
Mind. 1-2x3ml grüne Citratröhrchen oder 3-4x1,3 ml Citrat grün, (für PFA 100 1x3,8 ml Citrat blau)
- Urinstatus, organische Säuren im Urin
- Drogenscreening (evtl. polytoxikologisch)



Gerinnungsdiagnostik:
nach Rücksprache mit
Kontaktdaten
ergänzen!
evtl. weiterführende
Diagnostik,
insbesondere
Thrombozyten-
funktionsdiagnostik
Kontaktdaten
ergänzen!

Augenhintergrund

- Obligat unter 2-3 Jahren !
- Akut undilatiert, immer Kontrolle in Mydriasis wenn Patient stabil

Kindergynäkologischer Status

- Kindergynäkologisches Extra-Schema verwenden
- Später vorgesehen
- Erfolgt, Wertung: _____
- Nicht indiziert